



## Dyrkingsveiledning for *Nemesia x hybrida*

‘Nemesia’

### Jord

Veksttorv av god kvalitet, med innblanding av Perlite

### Potting

11-12 cm potter

### Temperatur – kulturtid

Hold 18-20°C etter innpotting. Et par uker etter potting senkes temperaturen trinnvis til 12-15°C. Kan dyrkes kaldt (10-12°C), dette forlenger kulturtida med et par uker.

Kulturtida er 7-11 uker fra innpotting avhengig av temperatur, lysforhold, tidspunkt for innpotting og pottestørrelse.

### Gjødsling/vanning

Nemesia skal holdes jevnt fuktige, ikke la plantene tørke for mye mellom hver vanning.

Næringsbehovet er middels stort, bruk LT 1,8 – 2,0. Svært høgt ledetall og /eller våte planter kan føre til problem med opptak av næring og angrep av sopp i røttene. pH i torva bør være 5 – 5,5. Nemesia krever mye jern i næringsløsningen, tilsett ekstra jern (100-150 gram 6 % jern per 10 kg fullgjødsel).

### Topping

Plantene toppes mykt en gang 1-2 uker etter potting, evt en gang til ved behov. Lange skudd kan klippes tilbake ved behov, plantene kommer raskt igjen etter nedklipping. Plantene toppes under evt knopp i småplantene.

### Plantevern

Etter potting anbefales en forebyggende sprøyting mot sopp, f. eks. med Rovral eller Teldor. Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør gjøres 1-3 uker etter potting. Videre bør plantene vannes med Topsin og Apron, dette gjøres 2-3 uker etter potting.

Nemesia er utsatt for angrep av trips og bladlus, angrep av mjøldogg kan også forekomme.

### Lys

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene, plantene skal ikke skygges. Lav temperatur og mye lys gir god kvalitet.

### Vekstregulering

Dropp har god effekt. Ved moderat dyrkingstemperatur er det mindre behov for veksthemming. Ved behov kan plantene sprøytes med 2-3 promille Alar.